

62. *BURTONIA LAVIGERIEI* Bourguignat, 1886; 5 valves. — Plages de l'Ouest.
63. *BURTONIA MOINETI* Bourguignat, 1886; 1 valve. — Plages de l'Ouest.
64. *CORBICULA RADIATA* Philippi, 1846; 2 exemplaires.
65. *CORBICULA FOAI* Mabille, 1901; 3 exemplaires.
66. *AETHERIA ELLIPTICA* de Lamarck, 1807; 1 échantillon et 1 valve.

*LISTE DES COQUILLES DE GASTROPODES REÇUES PAR M. CH. GRAVIER
DANS LE GOLFE DE TADJOURAH (1904) [Fin],*
PAR M. ÉDOUARD LAMY.

81. *STROMBUS (MONODACTYLUS) TRICORNIS* Lamarck.

1822. *Strombus tricornis* LAMARCK, *Anim. s. vert.*, t. VII, p. 201.
1845. *S. tricornis* Lk., KÜSTER, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., vol. IV, *Strombea*, pl. VI, fig. 6, 7, 8.

Djibouti : 4 individus adultes et 15 jeunes. — Obock (Jousseaume, 1888).

82. *STROMBUS (CANARIUM) DENTATUS* Linné.

1758. *Strombus dentatus* LINNÉ, *Syst. nat.*, 10^e éd., t. I, p. 745.
1795. *S. erythrinus* CHEMNITZ, *Syst. Conch. Cab.*, vol. XI, pl. CXCVI, fig. 187-1875.
1822. *S. plicatus* LAMARCK, *Anim. s. vert.*, vol. VII, p. 210.
1845. *S. plicatus* Lk., KÜSTER, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., vol. IV, *Strombea*, pl. XIII, fig. 3-4.
1850. *S. dentatus* L., REEVE, *Conch. Icon.*, vol. VI, g. *Strombus*, pl. IX, fig. 17.

Djibouti ; 80 ind. — Mer Rouge.

Un de ces exemplaires correspond par sa coloration rouge à la figure donnée par Chemnitz pour le *S. erythrinus*, forme signalée à Djibouti par M. H. Fischer (1901) et regardée par Tryon (*Man. of Conch.*, vol. VII, p. 119) et par M. Sturany (1903) comme une variété de *S. dentatus*.

83. *STROMBUS (CANARIUM) ELEGANS* Sowerby.

1847. *Strombus elegans* SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. I, pl. VII, fig. 43-48.
1850. *S. elegans* Sow., REEVE, *Conch. Icon.*, vol. VI, g. *Strombus*, pl. XVII, fig. 41 a.

Djibouti : 1 individu conforme à la figure de Reeve. — Mer Rouge.

84. *STROMBUS (CANARIUM) FLORIDUS* Lamarck.

1822. *Strombus floridus* LAMARCK, *Anim. s. vert.*, vol. VII, p. 211.
1843. *S. floridus* Lk., KIENER, *Coq. viv.*, *Ailées*, g. *Strombe*, pl. XXXII, fig. 1.

Djibouti : 80 individus, dont 2, présentant une couleur uniforme d'un jaune orangé, correspondent à la variété représentée dans la figure c de Kiener. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

85. *STROMBUS (CANARIUM) GIBBERULUS* Linné.

1758. *Strombus gibberulus* LINNÉ, *Syst. nat.*, 10^e éd., t. I, p. 744.

1747. *S. gibberulus* L., SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. I, pl. VI, fig. 18.

Djibouti : 25 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

86. *STROMBUS (CANARIUM) TEREBELLATUS* Sowerby.

1847. *Strombus terebellatus* SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. I, pl. IX, fig. 84.

Djibouti : 1 ind. — Aden (Shopland, 1902).

87. *PTEROCEA BRYONIA* Gmelin.

1790. *Strombus bryonia* GMELIN, *Syst. nat.*, 13^e éd., t. I, p. 3530.

1822. *Pterocera truncata* LAMARCK, *Anim. s. vert.*, t. VII, p. 195.

1851. *P. bryonia* Gm., REEVE, *Conch. Icon.*, vol. VI, g. *Pterocera*, pl. I.

Djibouti : 1 ind. — Obock (Jousseaume, 1888).

88. *ROSTELLARIA CURTA* Sowerby.

1847. *Rostellaria curta* SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. I, pl. V, fig. 11.

Djibouti : 1 individu jeune. — Aden (Shopland, 1902).

89. *TRIFORIS (VIRIOLA) CORRUGATUS* Hinds.

1843. *Triphoris corrugatus* HINDS, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, vol. XI, p. 18. — 1844.

HINDS, *Zool. Voy. "Sulphur"*, *Moll.*, pl. VIII, fig. 7.

Djibouti, îles Musha : 20 ind. — Aden (Shopland, 1902), mer Rouge (Sturany, 1903).

90. *TRIFORIS (MASTONIA) RUBER* Hinds.

1843. *Triphoris ruber* HINDS, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, vol. XI, p. 19. — 1844.

HINDS, *Zool. Voy. "Sulphur"*, *Moll.*, pl. VIII, fig. 15.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge (Sturany).

91. *TRIFORIS (MASTONIA) DUCOSENSIS* Jousseaume.

1884. *Mastonias ducoensis* JOUSSEAUME, *Bull. Soc. Malac. France*, t. I, pl. IV, fig. 10.

Djibouti : 1 individu, déterminé par M. le Dr Jousseaume, de cette espèce Néo-Calédonienne, reconnaissable à ses deux rangs de tubercules, colorés en violet dans la rangée antérieure, en jaune dans la postérieure.

92. *TRIFORIS (MASTONIA) SERVAINI* Jousseaume.

1884. *Mastonias Servaini* JOUSSEAUME, *Bull. Soc. Malac. France*, t. I, pl. IV, fig. 11.

Djibouti : 3 ind. — Mer Rouge.

Les exemplaires de cette espèce caractérisée par ses deux rangs de tubercules, qui sont blancs, séparés par des points noirs, dans la rangée antérieure, et qui sont orangés dans la postérieure, ont été déterminés par comparaison avec des spécimens de la collection de M. Dautzenberg.

93. TRIFORIS (MASTONIA) SIMILIS Pease.

1870. *Triphoris similis* PEASE, Proc. Zool. Soc. London, p. 774.

Djibouti : 1 individu.

Cet échantillon, dont nous devons la détermination à M. le Dr Jousseaume, appartient à une espèce signalée par Pease aux îles Hawaii; il présente des rangées alternantes de tubercules blancs et de tubercules bruns plus petits.

94. MODULUS TECTUM Gmelin.

1790. *Trochus tectum* GMELIN, Syst. nat., 13^e éd., t. I, p. 3569.

1853. *Modulus candidus* PETIT, Journ. de Conch., t. IV, pl. V, fig. 11.

Djibouti : 4 ind. — Mer Rouge.

95. PLANAXIS SAVIGNYI Deshayes.

1844. *Planaxis Savignyi* DESHAYES, Mag. de Zool., 2^e sér., vol. VI, Mollusques, pl. 109.

Djibouti : 250 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

96. LITTORINA SCABRA Linné.

1758. *Helix scabra* LINNÉ, Syst. nat., 10^e éd., t. I, p. 770.

1847. *Littorina intermedia* PHILIPPI, Abbild. Conch., Bd II, pl. V, fig. 8-9.

Djibouti : 3 ind. — Aden (Shopland, 1902).

97. TORINIA VARIEGATA Gmelin.

1790. *Trochus variegatus* GMELIN, Syst. nat., 13^e édit., t. I, p. 3575.

1837. *Solarium variegatum* Lk., KIENER, Coq. viv., g. Cadran, pl. IV, fig. 7.

Djibouti : 1 ind. roulé. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

98. RISSOINA SPIRATA Sowerby.

1830. *Rissoa spirata* SOWERBY, Gen. of rec. and foss. shells, g. *Rissoa*, fig. 3.

1901. *Rissoina spirata* Sow., H. FISCHER, Journ. de Conch., vol. XLIX, pl. IV, fig. 1-2.

Djibouti : 4 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

99. RISSOINA BOUVIERI Jousseaume.

1894. *Rissoina Bouvieri* Jousseaume, *Bull. Soc. Philom. Paris*, 8^e sér., t. VI, p. 102.

Djibouti : 1 individu déterminé par comparaison avec des spécimens donnés au Muséum par le Dr Jousseaume. — Aden, Djibouti (Jousseaume, 1894).

100. NARICA [VANIKORO] LIGATA Recluz.

1844. *Narica ligata* RECLUZ, *Rev. Zool. Soc. Cuv.*, p. 5.

1845. *N. ligata* RECLUZ, *Mag. Zool.*, 2^e sér., vol. VII, Mollusques, pl. CXXI, fig. 2.

Djibouti : 1 ind. — Aden (Shopland, 1902).

101. NATICA MAROCHIENSIS Gmelin.

1790. *Nerita marochiensis* GMELIN, *Syst. nat.*, 13^e éd., t. I, p. 3673.

1850. *Natica Gualteriana* PETIT, *Journ. de Conch.*, t. I, p. 396.

1855. *N. Gualteriana* Petit, REEVE, *Conch. Icon.*, vol. IX, g. *Natica*, pl. XXV, fig. 114.

Djibouti : 1 individu dont la coloration est assez semblable à la figure donnée par Reeve pour *N. Gualteriana*, une des nombreuses variétés de *N. marochiensis*.

102. NATICA (MAMMA) MAMILLA Linné.

1758. *Nerita mammilla* LINNÉ, *Syst. nat.*, 10^e éd., t. I, p. 776.

1855. *Natica mammilla* L., REEVE, *Conch. Icon.*, vol. IX, g. *Natica*, pl. VII, fig. 27 a-b.

Djibouti : 10 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

103. EULIMA BREVIS Sowerby.

1834. *Eulima brevis* SOWERBY, *Proc. Zool. Soc. London*, part II, p. 7. — 1855. SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. II, pl. CLXIX, fig. 32.

Djibouti (réef du Météore) : 1 ind. — Aden (Shopland, 1902).

104. PYRAMIDELLA (LONCHÆUS) SULCATA A. Adams.

1855. *Obeliscus sulcatus* A. Adams, SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. II, pl. CLXXI, fig. 34.

1855. *O. teres* A. Ad., SOWERBY, *id.*, fig. 31-32.

Obock : 2 ind. — Mer Rouge.

Ces individus sont conformes aux figures données par Sowerby pour *P. teres*, qui ne serait, d'après Tryon (*Man. of Conch.*, vol. VIII, p. 301), qu'une forme jeune et décolorée de *P. sulcata*.

105. PYRAMIDELLA (OTOPLEURA) MITRALIS A. Adams.

1853. *Pyramidella mitralis* A. ADAMS, *Proc. Zool. Soc. London*, p. 177.
1855. *P. mitralis* A. AD., SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. II, pl. CLXXII, fig. 9.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge.

106. NERITA ALBICILLA Linné.

1758. *Nerita albicilla* LINNÉ, *Syst. nat.*, 10^e éd., t. I, p. 778.
1883. *N. albicilla* L., SOWERBY, *Thes. Conch.*, part XL, pl. CDLIV, fig. 26-27.

Djibouti : 15 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

107. NERITA SQUAMULATA Le Guillou.

1841. *Nerita squamulata* LE GUILLOU, *Rev. Zool. Soc. Cuv.*, p. 344.
1889. *N. chamæleon* L. var. *squamulata* Le G., ED. VON MARTENS, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., vol. II, g. *Nerita*, pl. V, fig. 14-15.

Djibouti : 1 individu conforme aux figures citées du *Conchylien-Cabinet*.
— Océan Indien.

108. NERITA LONGII Recluz.

1842. *Nerita Longii* RECLUZ, *Rev. Zool. Soc. Cuv.*, p. 178.
1846. *N. Longii* Recl., REEVE, *Conch. Icon.*, vol. IX, g. *Nerita*, pl. XI, fig. 52 a-b.
1889. *N. Longii* Recl., ED. VON MARTENS, *Syst. Conch. Cab.*, vol. II, g. *Nerita*, pl. IX, fig. 1-3.

Djibouti : 15 ind. — Obock (Jousseaume, 1888).

Les exemplaires rapportés par M. Gravier correspondent, par leurs côtes lisses présentant des taches brunes et noires, aux figures de Reeve, mais non à celle donnée par Recluz (*Journ. de Conch.*, t. I, 1850, pl. 11, fig. 4), ni à celle de Sowerby (*Thes. Conch.*, part XL, 1883, pl. 467, fig. 90). Plusieurs grands échantillons corrodés sont exactement semblables aux figures 1 et 2 du *Conchylien-Cabinet*.

109. NERITA (PILA) QUADRICOLOR Gmelin.

1790. *Nerita quadricolor* GMELIN, *Syst. nat.*, 13^e éd., t. I, p. 3684.
1855. *N. quadricolor* Gm., REEVE, *Conch. Icon.*, vol. IX, g. *Nerita*, pl. I, fig. 4 a-b.

Djibouti : 8 ind. — Mer Rouge.

110. NERITA (ODONTOSTOMA) RUMPHII Recluz.

1841. *Nerita Rumphii* RECLUZ, *Rev. Zool. Soc. Cuv.*, p. 147.
1855. *N. Rumphii* Recl., REEVE, *Conch. Icon.*, vol. IX, g. *Nerita*, pl. XIV, fig. 62.

1889. *N. polita* L. var. *Rumphii* Redl., Ed. von MARTENS, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., vol. II, g. *Nerita*, pl. XIV, fig. 9.

Djibouti : 20 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

Parmi ces individus de couleurs variées, on trouve notamment la variété *c* de Reeve, grise à trois bandes roses, dont la moyenne est dédoublée, et la variété rougeâtre à trois bandes sombres, représentée dans la figure 9 du *Conchylien-Cabinet*.

111. *NERITINA (SMARAGDIA) FEUILLETI* Audouin.

1817. SAVIGNY, *Descr. Égypte*, Hist. nat., Planches, t. II, Coquilles, pl. V, fig. 11.

1827. *Neritina Feuilleti* AUDOUIN, *Descr. Égypte*, t. XXII, Hist. nat., Expl. somm. planch. Mollusques, p. 179.

Djibouti : 20 ind. — Mer Rouge.

112. *PHASIANELLA (ORTHOMESUS) VARIEGATA* Lamarck.

1822. *Phasianella variegata* LAMARCK, *Anim. s. vert.*, vol. VII, p. 53.

1843. *P. variegata* Lk., KIENER, *Coq. viv.*, g. *Phasianella*, pl. IV, fig. 1.

Djibouti : 200 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

Ces nombreuses coquilles sont de colorations variées, mais présentent toujours de fines lignes transverses articulées de blanc et de rouge, avec des maculations formant de grandes zones longitudinales brunes plus ou moins accentuées.

113. *TURBO RADIATUS* Gmelin.

1790. *Turbo radiatus* GMELIN, *Syst. nat.*, 13^e éd., t. I, p. 3594.

1848. *T. Chemnitzianus* REEVE, *Conch. Icon.*, vol. IV, g. *Turbo*, pl. VIII, fig. 36.

1852. *T. radiatus* Gm., PHILIPPI, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., t. II, g. *Turbo*, pl. VI, fig. 9-10.

Djibouti : 2 ind. — Obock (Jousseaume, 1888).

114. *TURBO PUSTULATUS* Brocchi.

1817. SAVIGNY, *Descr. Égypte*, Hist. nat., Planches, t. II, Coquilles, pl. V, fig. 26-2.

1888. *Turbo pustulatus* Brocchi, TRYON, *Man. of Conch.*, vol. X, p. 207, pl. XLIV, fig. 8o.

Djibouti : 10 ind. — Mer Rouge.

115. *TURBO (MARMOROSTOMA) CORONATUS* Gmelin.

1790. *Turbo coronatus* GMELIN, *Syst. nat.*, 2^e éd., t. I, p. 3594.

1852. *T. coronatus* Gm., PHILIPPI, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., vol. II, g. *Turbo*, pl. VI, fig. 13.

1852. *T. Hemprichi* Troschel, PHILIPPI, *id.*, pl. XVI, fig. 1.

Djibouti : 1 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

116. TROCHUS (TECTUS) DENTATUS Forskal.

1775. *Trochus dentatus* FORSKAL, *Descr. Anim. Itin. Orient.*, p. 125.
1846. *T. dentatus* Forsk., PHILIPPI, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., g. *Trochus*, pl. II, fig. 1-2.
1889. *T. dentatus* Forsk., PILSBRY, *Man. of Conch.*, vol. XI, pl. III, fig. 23.

Djibouti : 6 ind. — Mer Rouge.

117. TROCHUS (TECTUS) NODULIFERUS Lamarck.

1822. *Trochus noduliferus* LAMARCK, *Anim. s. vert.*, t. VII, p. 18.
1846. *T. noduliferus* Lk., PHILIPPI, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., vol. II, g. *Trochus*, pl. II, fig. 3-4.

Djibouti : 2 ind. — Mer Rouge.

118. TROCHUS (INFUNDIBULUM) ERYTHRÆUS Brocchi.

1817. SAVIGNY, *Descr. Égypte*, Hist. nat., Planches, t. II, Coquilles, pl. V, fig. 38-39.
1846. *T. erythræus* Brocchi, PHILIPPI, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., vol. II, g. *Trochus*, pl. XLII, fig. 12.

Djibouti : 25 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

119. CLANCUS PHARAONIUS Linné.

1758. *Trochus pharaonius* LINNÉ, *Syst. nat.*, 10^e éd., t. I, p. 757.
1848. *T. pharaonius* L., PHILIPPI, *Syst. Conch. Cab.*, 2^e éd., vol. II, g. *Trochus*, pl. XIV, fig. 1.

Djibouti : 8 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

120. CLANCUS GENNESI H. Fischer.

1817. SAVIGNY, *Descr. Égypte*, Hist. nat., Planches, t. II, Coquilles, pl. III, fig. 3-1-1'.
1901. *Clanculus Gennesi* H. FISCHER, *Journ. de Conch.*, vol. XLIX, n° 2, pl. IV, fig. 11-12.
1903. *Euchelus erythræensis* R. STURANY, *Gastrop. Roth. Meer. Exp. «Pola»*, *Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, Bd LXXIV, pl. V, fig. 6.

Djibouti : 4 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

Ces échantillons ont été déterminés d'après le type faisant partie de la collection du *Journal de Conchyliologie*. M. H. Fischer a démontré dans une note récente (*Journ. de Conch.*, vol. LII, 1904, p. 59) l'identité de l'*Euchelus erythræensis* Stur. avec le *Clanculus Gennesi*.

121. GIBBULA PHASIANELLA Deshayes.

1863. *Turbo phasianellus* DESHAYES, *Cat. Moll. Réunion*, p. 74, pl. 9, fig. 13-14.

Djibouti, îles Mousha : 3 individus qui correspondent bien à la description de Deshayes, avec des marbrures brunes et de fines linéoles transverses articulées de blanc, et que l'obligeance de M. Dautzenberg nous a permis d'ailleurs de comparer à des exemplaires de sa collection, provenant de Nouvelle-Calédonie.

122. **GIBBULA (PRIOTROCHUS) SEPULCHRALIS** Melvill.

1899. *Priotrochus sepulchralis* J.-C. MELVILL, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 7^e sér., IV, p. 96, pl. II, fig. 6.

Djibouti : 1 individu concordant avec des spécimens de la collection de M. Dautzenberg. — Golfe Persique (Melvill).

123. **AGAGUS AGAGUS** Jousseaume.

1894. *Agagus agagus* JOUSSEAUME, *Bull. Soc. Philom. Paris*, 8^e sér., t. VI, p. 99.

Obock : 12 ind. — Baie de Tadjourah (Jousseaume, 1888), Aden (Shopland, 1902).

La détermination de ces coquilles a été faite par leur comparaison avec des échantillons donnés au Muséum, en 1896, par M. le Dr Jousseaume.

124. **GENA VARIA** A. Adams.

1850. *Gena varia* A. ADAMS, *Proc. Zool. Soc. London*, pl. XVIII, p. 37.

1855. *G. varia* Ad., SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. II, pl. CLXXIII, fig. 8.

Djibouti (Récif du Météore) : 1 individu de couleur rose mêlée de blanc. — Mer Rouge (Sturany, 1903).

125. **HALIOTIS SCUTULUM** Reeve.

1846. *Haliotis scutulum* REEVE, *Conch. Icon.*, vol. III, g. *Haliotis*, pl. XVI, fig. 63.

Djibouti (îles Mousha) : 6 ind. — Mer Rouge (Sturany, 1903).

126. **FISSURELLA (GLYPHIS) RÜPPELLI** Sowerby.

1834. *Fissurella Rüppelli* SOWERBY, *Proc. Zool. Soc. London*, pl. II, p. 128. — 1866. SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. III, pl. 240, fig. 107-108.

Djibouti (îles Mousha) : 5 ind. — Mer Rouge.

127. **SUBEMARGINULA IMBRICATA** A. Adams.

1851. *Subemarginula imbricata* A. ADAMS, *Proc. Zool. Soc. London*, pl. XIX, p. 91.

1866. *Emarginula imbricata* Ad., SOWERBY, *Thes. Conch.*, vol. III, pl. 247, fig. 70-71.

Djibouti (îles Musha) : 1 individu, à coquille très corrodée, dont nous devons la détermination à M. Dautzenberg.

128. *PATELLA (HELIONISCUS) ROTA* Gmelin.

1790. *Patella rota* Gmelin, *Syst. nat.*, 13^e éd., t. I, p. 3720.
1854. *P. rota* Chemn., Reeve, *Conch. Icon.*, vol. VIII, g. *Patella*, pl. XVII,
fig. 39.

Obock : 1 individu de petite taille. — Mer Rouge.

129. *ATYS NAUCUM* Linné.

1758. *Bulla naucum* LINNÉ, *Syst. nat.*, 10^e éd., t. I, p. 726.
1855. *B. naucum* L., A. ADAMS, *Thes. Conch.*, vol. II, pl. CXXIV, fig. 107.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge.

130. *ATYS (ALICULA) CYLINDRICA* Helbling.

1855. *Bulla cylindrica* Helbling, A. ADAMS, *Thes. Conch.*, vol. II, pl. CXXV,
fig. 114.

Djibouti : 6 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

131. *BULLA AMPULLA* Linné.

1758. *Bulla ampulla* LINNÉ, *Syst. nat.*, 10^e éd., t. I, p. 727.
1855. *B. ampulla* L., A. ADAMS, *Thes. Conch.*, vol. II, pl. CXXII, fig. 59-62.

Djibouti : 4 ind. — Mer Rouge.

LE TRIODONTOPHORUS DEMINUTUS, NOUVEAU SCLÉROSTOMIEN
PARASITE DE L'HOMME, ET LA CACHEXIE AFRICAINNE,
PAR MM. A. RAILLIET ET A. HENRY.

Grâce à l'obligeance de M. le professeur Joubin, nous avons pu étudier, dans la collection des Nématodes du Muséum, un Sclérostomien fort intéressant, qui représente un nouveau parasite de l'homme.

Il en existe seulement deux exemplaires : un mâle et une femelle, le premier légèrement altéré, tous deux laissant à désirer sous le rapport de la transparence. La description que nous allons en donner demeurera par suite incomplète sur plusieurs points de détail.

Dans les deux espèces, le corps — après conservation dans l'alcool — est blanchâtre, cylindrique, atténue aux deux extrémités, mais plus longue-ment en avant qu'en arrière.

Le tégument est très nettement strié en travers; les stries ont, en moyenne, un écartement de 12 μ . La cuticule ne forme pas d'étrangle-